

Samsvarighet mellom kognitive test resultater og pårørendes informasjon om kognitiv funksjon og IADL hos pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitiv svikt og demens.

Agreement- studien

Prosjektleder Knut Engedal

Stipendiat Karin Persson

Veiledere

Knut Engedal

Anne Brækhus

Geir Selbæk

Prosjektinformasjon

Målet med studien var å undersøke hvilken effekt pårørendes selvopplevde belastning og pasientens grad av nevropsykiatriske symptom har på pårørendes rapportering om pasientens kognitive funksjon og IADL fungering.

Metode: 1832 pasienter fra spesialisthelsetjenesten ble inkludert (data fra NorKog); 742 med mild kognitiv svikt og 1090 med demens, gjennomsnittsalder 75,2 (SD 9,5) og 56 % kvinner. Følgende skalaer ble brukt: Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE), Lawton and Brody I-ADL skala, Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q), Relatives' Stress Scale (RSS), Mini Mental State Examination (MMSE), and Clock Drawing Test (CDT).

Korrelasjonsanalyser og analyse med multippel lineær regresjon ble utført for å undersøke hvilke faktorer som var assosierte med IQCODE og IADL.

Publikasjoner

Persson K, Anne Brækhus A, Selbæk G, Kirkevold Ø, Engedal K. Burden of Care and Patient's Neuropsychiatric Symptoms Influence Carer's Evaluation of Cognitive Impairment. Dement Geriatr Cogn Disord 2015;40:256–267